Hyperoil®

Πλήρης σειρά φυσικών προϊόντων επούλωσης ελκών και τραυμάτων κάθε αιτιολογίας.

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν είναι ένα βοηθητικό μέσο για την αποκατάσταση των δερματικών ιστών σε οξείες και χρόνιες βλάβες (επιφανειακές δερματικές βλάβες διάφορων τύπων, μικρής έκτασης εγκαύματα, ραγάδες, έλκη πίεσης, αγγειακές βλάβες, καθώς και βλάβες λόγω διαβήτη, με έκθεση του δέρματος ή/και του οστικού ιστού). Επίσης, ενδείκνυται ιδιαίτερα στη διαχείριση των δερματικών μοσχευμάτων. Χάρη στη δράση προστασίας των ιστών και στις ιδιότητες ελέγχου του βακτηριακού φορτίου συμβάλει στην επούλωση εκδορών και αμυχών διαφόρων τύπων, καθώς και ραγάδων. Στην περίπτωση δύσκολων δερματικών βλαβών με απώλεια ουσίας και έκθεση του δέρματος, βοηθά στη μείωση του ινώδους και διεγείρει το σχηματισμό κοκκιώδους ιστού. Το προϊόν διατηρεί την ενυδάτωση των ιστών και αποτρέπει το σχηματισμό εσχάρας και τον εμποτισμό της περιοχής γύρω από τη βλάβη. Το προϊόν δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηριακών αποικιών στην υπό θεραπεία περιοχή.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν (MD class II). Μόνο για δερματική χρήση.
Χρήστες του προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κέντρα υγειονομικής περίθαλψης ή κατ' οίκον, υπό κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στη χρήση του προϊόντος και υπό ιατρική επίβλεψη.
Εφαρμογή
Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, η δερματική βλάβη πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες, καθώς και σε κάθε αλλαγή της επίδεσης. Συνιστάται η κατάλληλη αφαίρεση νεκρωτικών ιστών ή αποξηραμένης εσχάρας (εφελκίδα) σε δερματικές βλάβες που δεν έχουν καλυφθεί πλήρως με επιθήλιο. Τα έλκη επουλώνονται ταχύτερα εφόσον επιδένονται κατάλληλα , με αλλαγή της επίδεσης σε κάθε εφαρμογή. Το προϊόν, στις διάφορες μορφές στις οποίες διατίθεται, πρέπει να εφαρμόζεται με ημερήσια έως εβδομαδιαία συχνότητα, ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις, την τυπολογία και τη θέση της υπό θεραπεία βλάβης.
Ελαιώδης μορφή. Γυάλινα πορτοκαλί φιαλίδια με ή χωρίς σταγονόμετρο.
Στην περίπτωση μικρών και μεγάλων υποσκαμμένων ή ανοιχτών κρατήρων (π.χ. μεγάλες πληγές κατάκλισης), το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε αποστειρωμένες γάζες που τοποθετούνται απευθείας, καλύπτοντας όλη τη περιοχή της βλάβης. Για να συγκρατηθούν οι γάζες στη θέση τους, μπορεί να τοποθετηθεί, εάν απαιτείται, ένα αδιάβροχο και ημιδιαπερατό προϊόν (διαφανής μεμβράνη πολυαιθυλενίου).**Σημαντικό**. Οι εμποτισμένες γάζες με HYPEROIL σε ελαιώδη μορφή πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται σε κάθε επίδεση, χωρίς να απαιτείται καθαρισμός της της βλάβης ή μετά από απλό καθαρισμό, εάν απαιτείται, με διάλυμα φυσιολογικού ορού.
Μορφή γέλης
Στην περίπτωση ινωδών δερματικών βλαβών με κοιλότητα, σήραγγα ή σημαντική απώλεια ουσίας, το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί πιο εύκολα σε μορφή γέλης, απευθείας στην περιοχή της βλάβης και να συγκρατηθεί στη θέση του με μεμβράνη πολυαιθυλενίου. **Σημαντικό**. Η υπολειπόμενη ποσότητα γέλης στη υπό θεραπεία περιοχή, μετά την αφαίρεση της μεμβράνης. πρέπει να απομακρύνεται. Απαιτείται καθαρισμός με άφθονο διάλυμα φυσιολογικού ορού πριν από την εκ νέου εφαρμογή της γέλης.
Μορφή σπρέι
Ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε το ακροφύσιο ψεκασμού. Μετά τον ψεκασμό της απαιτούμενης ποσότητας, βιδώστε ξανά το καπάκι, ώστε να διασφαλιστεί η αεροστεγανότητα του προϊόντος.
Μορφή εμποτισμένης γάζας
Κουτί 10 τμχ. 10Χ10 εμποτισμένες γάζες – Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε αλλεργικά άτομα μη ανεκτικά στη βαζελίνη. Μορφή γάζας με βαζελίνη. Κουτί 40 τμχ. 10Χ10 με βαζελίνη – Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αλλεργικά άτομα ή άτομα μη ανεκτικά στη βαζελίνη.
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για τη θεραπεία οξέων βλαβών (εγκαυμάτων, εκδορών, μετεγχειρητικών τραυμάτων) και χρονίων βλαβών σε φάση μειωμένης επανεπιθηλιοποίησης των δερματικών ιστών, με προδιάθεση για ανάπτυξη βακτηριακών αποικιών και μέτρια επουλωτική ικανότητα. Ανοίξτε το κουτί, αφαιρέστε τη γάζα με μία λαβίδα και τοποθετείστε την στην περιοχή της βλάβης μετά τον καθαρισμό της. Εάν απαιτείται, τοποθετείστε συμπληρωματική απορροφητική επίδεση. **Σημαντικό**. Οι γάζες πρέπει να αφαιρούνται κάθε δύο/τρεις ημέρες και να αντικαθίστανται σε κάθε επίδεση, χωρίς να απαιτείται καθαρισμός της βλάβης ή μετά από απλό καθαρισμό με διάλυμα φυσιολογικού ορού.
Περιορισμοί χρήσης
Το προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό σε νεκρωτικούς ιστούς ή σε περίπτωση ιστικής υποξίας κάτω των 30 mmHgO2.
Αντενδείξεις
Μην χρησιμοποιείτε αλοιφές ή απολυμαντικά στην υπό θεραπεία περιοχή παράλληλα με το προϊόν. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης των διαφόρων μορφών του προϊόντος μπορεί να προκληθεί καθυστερημένη επούλωση των ιστών και να παρεμποδιστεί η φυσιολογική διαδικασία της επούλωσης. Μπορεί να εμφανιστεί υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά ή σε κάποιο από τα έκδοχα : στην περίπτωση αυτή, απαιτείται διακοπή της χρήσης του προϊόντος και έναρξη κατάλληλης θεραπείας. Η παρατεταμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε παροδική απώλεια του τριχωτού στην περιοχή της εφαρμογής. Η εφαρμογή του προϊόντος, σε οποιαδήποτε μορφή, μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση προσωρινού αισθήματος καύσου, αιμορραγίας, αισθήματος κνησμού ή ερυθήματος γύρω από την περιοχή της βλάβης, κατά την διάρκεια της σταδιακή ς μείωσης του πόνου στο σημείο της βλάβης.
Προειδοποιήσεις

1. Σε πολλές περιπτώσεις αποφεύγεται η χρήση τοπικής αντιβιοτικής θεραπείας ή μειώνεται η διάρκεια της συστηματικής αντιβιοτικής θεραπείας.
2. Αποφεύγετε τη χρήση απολυμαντικών, καθώς επιδρούν αρνητικά στη διαδικασία επούλωσης.
3. Το προϊόν είναι ευαίσθητο στον αέρα και στο φως. Συνεπώς, πρέπει να εκτίθεται στον αέρα μόνο για το διάστημα που απαιτείται κατά τη χρήση του. Κλείνετε καλά τον περιέκτη μετά τη χρήση του.
4. Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο. Σε θερμοκρασίες κάτω των 16^{o} C, το σκεύασμα ελαιώδους μορφής έχει την τάση να στερεοποιείται, ωστόσο μόλις εφαρμοστεί στο δέρμα ρευστοποιείται αμέσως.
5. Το προϊόν, το οποίο περιέχει ουσίες φυτικής προέλευσης, δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Μπορεί να εμφανιστούν αλλεργίες, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί έως σήμερα.
6. Οι εμποτισμένες γάζες και οι περιέκτες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς μετά τη χρήση τους.
7. Μην χρησιμοποιείτε την ίδια εμποτισμένη γάζα σε άλλους ασθενείς.
8. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί κλινικά σε εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού.
9. Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.
10. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Δραστικά συστατικά: Αζαδιραχτίνη, υπερφορίνη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ MEDICAL MATE ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ Θεσσαλονίκη, info@medicalmate.gr, medicalmate.gr